

Advokaterne Németh & Sigetty A/S
Frederiksgade 21

1265 København K

Att. Advokat Claus Hastrup Knudsen

Svar på Deres brev af 24. august 2012

Den 24. august 2012 har De stillet Sundhedsstyrelsen tre spørgsmål.

Spørgsmål 1:

Hvad forstås ved behandling af børn og unge, hvilken aldersgruppe er det

Svar:

Sundhedsstyrelsen har udsendt "vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser" – vejledning nr. 10.332 af 10. december 2007. Denne vejledning dækker den medikamentelle behandling af børn og unge under 18 år.

Spørgsmål 2:

De har anmodet Sundhedsstyrelsen om at oplyse om præparatet Sertalin er et præparat identisk med Fluoxetin?

Svar:

De to antidepressive lægemidler sertralin og Fluoxetin tilhører begge gruppen af selektive serotonin re-uptake hæmmere (SSRI). Kemisk er de to stoffer ikke identiske, men der findes ikke kliniske undersøgelser, som med sikkerhed har kunnet fastslå klinisk betydende forskelle med hensyn til de to lægemidlers effekt til behandling af depression hos voksne. Hos børn og unge (under 18 år) findes kun en begrænset mængde kliniske undersøgelser af effekt og sikkerhed ved behandling af depression med SSRI. Både sertralin og Fluoxetin er vist at have en klinisk effekt, som er større end placebo (inaktiv behandling), men en enkelt såkaldt meta-analyse (samlet analyse af flere mindre undersøgelser under et) har konkluderet, at Fluoxetin er det eneste SSRI som har en klinisk relevant effekt ved behandling af depression hos børn/unge.

Spørgsmål 3:

Hvilke regler skal en praktiserende læge følge ved udstedelse af antidepressiv medicin til en patient på 20 år.

Svar:

Enhver læge er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af sit virke. Det fremgår af autorisationslovens § 17.

30-08-2012

j.nr.5-1010-128/1/
TOH

Tilsyn og Patientsikkerhed

Axel Heides Gade 1
2300 København S
Tlf. 7222 7400
Fax 7222 7402

E-post sst@sst.dk
Web sst.dk

Dir. tlf. 7222 7805
E-post eft@sst.dk

Sundhedsstyrelsen har i Vejledning om behandling med antidepressiva fra 2000 præciseret den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling med disse lægemidler.

Med venlig hilsen


Torben Hørslev
Overlæge