



medicin.dk

Sertralin "Orion"

Firma

Orion Pharma

Indeholder

Sertralin "Orion" er et middel mod depression. **SSRI**.

Virksomme stoffer

Sertralin

Anvendes

Sertralin "Orion" til behandling af depression.

Midlet anvendes desuden ved angst for samvær med andre (socialfobi), panikangst, stress efter ulykker eller lign. voldsomme hændelser (posttraumatisk stresstilstand (PTSD)) samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).

Virker

ved at øge mængden af signalstoffet **serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen**. Fejlregulering af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.

Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 3-4 ugers behandling.

Dosering

Findes som tabletter.

Depression:

Voksne. Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet. Efter en uge kan dosis øges med 50 mg ad gangen med mindst 1 uges mellemrum. Højeste døgndosis er 200 mg.

Panikangst, socialfobi og posttraumatisk stresstilstand (PTSD):

Begyndelsesdosis. 25 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 50 mg i døgnet efter én uge og derefter med 50 mg ad gangen med mindst 1 uges mellemrum. Højeste døgndosis er 200 mg.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD):

Voksne og børn over 13 år. *Begyndelsesdosis.* Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet. Efter en uge kan dosis øges med 50 mg ad gangen med mindst 1 uges mellemrum. Højeste døgndosis er 200 mg. *Børn 6-13 år.* *Begyndelsesdosis.* Sædvanligvis 25 mg 1 gang i døgnet. Efter 1 uge kan dosis øges til 50 mg 1 gang i døgnet og derefter med 50 mg ad gangen med mindst 1 uges mellemrum. Højeste døgndosis er 200 mg.

Bemærk: Delekærven kan ikke anvendes til at dosere to halve tabletter, den kan kun gøre det nemmere at sluge tabletten.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Man har kendskab til flere tusinde gravide, som har været behandlet i de første 3 måneder af graviditeten, uden der er opstået fosterskade. Der kan dog være en lille risiko for, at barnet kan have forhøjet blodtryk i lungekredsløbet med åndenød, hurtig vejrtrækning og blålig hud og læber.

Hvis man bliver behandlet sidst i graviditeten, kan barnet være påvirket efter fødslen. I langt de fleste tilfælde ses lette symptomer (gråd, rystelser og besvær med at die og sove), der forsvinder af sig selv. I enkelte sjældne tilfælde kan symptomerne være mere alvorlige med kramper og vejrtrækningsbesvær.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Det er kun meget små mængder af Sertralin "Orion", der er i modermælk, og derfor kan Sertralin "Orion" formentlig anvendes. Spørg dog altid din læge til råds, hvis du ammer og tager Sertralin "Orion".

Mulige bivirkninger

Meget almindelige (over 10%)

Gastro-intestinale biv

Mundtørhed, kvalme, diarré.

Neurologiske/psykiske biv

Svimmelhed, søvnløshed, træthed, hovedpine.

Almindelige (1-10%)

Generelt/øvrige biv

Nedsat eller **øget appetit.**

Gastro-intestinale biv

Smagsforstyrrelser, fordøjelsesbesvær, opkastning, mavesmerter, forstoppelse, luft fra tarmen.

Cirkulatoriske/respiratoriske biv

Hjertebanken, brystmerter.

Metabol./endokrinologiske biv

Hedetur.

Muskuloskeletale biv

Muskelsmerter.

Neurologiske/psykiske biv

Angst, **uro, rastløshed, nervøsitet, koncentrationsbesvær**, depression, personlighedsforstyrrelser, mareridt, gaben, rysten, muskelstivhed, ændring i hudens følesans, tænderskæren.

Hud

Hududslæt, øget svedtendens.

Immunologiske biv.

Ondt i halsen.

Urogenitale biv

Seksuelle forstyrrelser.

Øjne og ører

Synsforstyrrelser, øresusen (tinnitus).

Ikke almindelige (0,1–1%)

Generelt/øvrige biv

Feber, vægtændring, tørst.

Gastro-intestinale biv

Spiserørskatar, synkebesvær, øget spytdannelse, mundhulegener.

Cirkulatoriske/respiratoriske biv

Muskelsammentrækninger i luftrørene, åndenød, forhøjet blodtryk, væskeophobning i fx arme og ben, næseblod.

Muskuloskeletale biv

Muskelsvaghed.

Neurologiske/psykiske biv

Migræne, hallucinationer, opstemthed (eufori), hukommelsesbesvær, motoriske forstyrrelser, kramper, talebesvær, besvimelsesanfald.

Hud

Hårtab, nældefeber, småblødninger i hud og slimhinder.

Immunologiske biv.

Snue, luftvejsinfektion.

Urogenitale biv

Vandladningsbesvær, blødning fra skeden.

Øjne og ører

Hævelse omkring øjnene.

Sjældne (0,01–0,1%)

Gastro-intestinale biv

Mundbetændelse, påvirkning af leverens funktion.

Cirkulatoriske/respiratoriske biv

Langsom puls, blodprop i hjertet, lokal blodmangel i fx arme og ben, sammentrækninger i strubemuskulaturen.

Metabol./endokrinologiske biv

Mælkeflåd.

Muskuloskeletale biv

Øget risiko for knoglebrud.

Neurologiske/psykiske biv

Koma, psykoser, aggressivitet, selvmordstanker, ufrivillige rykkende bevægelser.

Hud

Betændelse i huden.

Immunologiske biv.

Infektioner (bl.a. i øret og i underlivet).

Urogenitale biv

Langvarig smertefuld erektion.

Øjne og ører

Grøn stær.

OBS**I starten af behandlingen og hos unge under 25 år kan der være en øget risiko for selvmordsforsøg.****Hos børn og unge under 18 år forekommer selvmordstanker under behandlingen hyppigere end hos voksne.** Midlet bør kun bruges til børn og unge under 18 år ved obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) og behandlingen skal så varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Ved behandling mod panikangst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.

Ved skizofreni kan de psykotiske symptomer forværres.

Ved langtidsbehandling af børn, bør fysisk og psykisk udvikling kontrolleres jævnligt.

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer, lever, ved epilepsi, ved nedsat krampetærskel og mani. Midlet bør helt undgås ved meget dårligt fungerende lever.

Desuden forsigtighed ved hjerte-karsygdomme og i de første måneder efter en blodprop i hjertet.

Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.

Ved tegn på allergisk reaktion, mani, kramper eller forværring af epilepsi skal behandlingen stoppes.

Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over mindst 4 uger, idet der ved pludseligt ophør i sjældne tilfælde kan optræde rysteture, hjertebanken, almen utilpashed og feber.

Grapefrugtjuice kan øge virkningen og bør undgås under behandlingen.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Samtidig behandling med sumatriptan (migrænemiddel) eller lithium (middel mod manier) kan medføre bivirkninger.

Sertralin "Orion" bør ikke tages, hvis man er i behandling med pimozid (middel mod psykoser), MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).

Samtidig brug af visse andre midler mod depression (andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotonin syndrom – en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Der er risiko for øget tendens til blødninger, hvis man samtidig tager midler, der kan påvirke blodets størkningsevne (fx NSAID-midler mod smerter).

Specielt ved høje doser kan sertralin øge virkningen af en række andre midler – bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser og visse andre midler mod depression (tricykliske antidepressive midler).

Hvis man samtidig tager warfarin (blodfortyndende middel), kan det være nødvendigt, at justere doseringen af warfarin.

Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Sertralin "Orion".

Trafik

Ingen advarsel.

Findes som

Tabletter: 1 tablet indeholder enten 50 mg (**udgået 17.10.11**) (filmovertrukken eller 100 mg (filmovertrukken) sertralin. *Hjælpestof:* Farve: Titandioxid E171.

Identifikation

Dispensationsform og styrke	Præg	Kærv	Farve	Foto
Tabletter 50 mg (delekærv for nemmere indtagelse)	A 81	Delekærv	Hvid	Billede
Tabletter 100 mg	A 82	Ingen kærv	Hvid	Billede

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

Tilskud	Produktnavn	Pris i kr.
A	Tabletter 100 mg (Recept) 100 stk. (blister)	361,70

medicin.dk