

Buronil

Producent: MediLink

Indeholder

Buronil® er et middel mod psykoser. Højdosismiddel.

Virksomme stoffer

Melperon (methylperon)

Anvendelse

Buronil® anvendes til behandling af psykoser.

Dosering

Findes som tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Psykoser:

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (25 mg) 3 gange i døgnet. *Vedligeholdelsesdosis.* Sædvanligvis 4-12 tabletter (100-300 mg), i nogle tilfælde op til 24 tabletter (600 mg), i døgnet fordelt på flere doser.

Mulige bivirkninger

Meget almindelige (over 10%)	Sløvhed, svimmelhed.
------------------------------	----------------------

Almindelige (1-10%)	Mundtørhed. Parkinsonisme.
---------------------	-------------------------------

Ikke almindelige (0,1-1%)	Gulsot, tilstopning af galdevejene. Blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op. Ufrivillige bevægelser, hovedpine, antikolinergt syndrom.
---------------------------	--

Sjældne (0,01-0,1%)	Hjerterytmeforstyrrelser.
---------------------	---------------------------

Meget sjældne (under 0,01%)	Mælkeflåd, udvikling af bryster hos mænd. Maligt neuroleptikasyndrom. Alvorlig hudreaktion. Menstruationsforstyrrelser, rejsningsproblemer.
-----------------------------	--

- En række bivirkninger er set ved brug af Buronil®, uden at det har været muligt at fastlægge hyppigheden. De mest alvorlige er: Forstyrrelser i hjerterytmen, hjertestop, pludselig uforklarlig død.
- Blodtryksfald ses især når behandlingen startes med en høj dosis.
- Antikolinergt syndrom kan vise sig ved flere symptomer - bl.a. mundtørhed, sløret syn, konfusion og hjertebanken.
- Maligt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring, rysten og ufrivillige langsomme bevægelser. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
- Sløvhed ses mest i starten af behandlingen.
- Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
- Ved behandling med midler mod psykoser, er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QT_c-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

Bør ikke anvendes

Ved svækket bevidsthed, kredsløbskollaps samt ved forandringer i blodets sammensætning bør midlet ikke anvendes.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. [Der er forskel mellem anbefalingerne i medicin.dk og indlægssedlen.](#)

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Der er forskel mellem anbefalingerne i medicin.dk og indlægssedlen.

Trafik

Ingen advarsel.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.

Den beroligende virkning indtræder inden for 1 time. Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen ved psykoser kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmoverttrukket) indeholder 25 mg melperonhydrochlorid.

Særlige advarsler

- Midlet skal anvendes med forsigtighed hvis man har øget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen, ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær) samt af mænd med forstørret prostata, da vandladningen kan gå helt i stå.
- Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved meget dårligt fungerende lever eller nyrer.
- Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
- Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
- Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
- Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

- Buronil® kan påvirke en samtidig behandling med andre lægemidler.
- Generel forsigtighed ved brug af andre lægemidler der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser. En del af disse

midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).

- Buronil[®] forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
- En række midler (heriblandt visse midler mod depression og visse midler mod svamp) kan øge virkningen af Buronil[®].
- Buronil[®] kan øge virkningen af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
- Buronil[®] kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

Tilskud	Udlevering	Dispenseringsform og styrke	Pakning	Pris i kr.
●	Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemlum yderligere udlevering må finde sted	overtrukne tabletter 25 mg	100 stk.	116,60

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk[®], DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk[®] og DLI [her](#).

